



La Définition de cas de COVID-19 en Tunisie

(Mise à jour le 15/04/2020)

Un cas suspect

1. Toute personne :
 - Présentant une **fièvre** et/ou **au moins un signe/symptôme d'infection respiratoire aiguë** (**toux** ou **difficulté respiratoire**)
 - **ET** ayant **voyagé** ou **séjourné** dans une **zone d'exposition à risque** dans les **14 jours précédant** la date de début des signes
2. Toute personne présentant des **signes de détresse respiratoire aiguë** pouvant aller jusqu'au **SDRA** (Syndrome de détresse respiratoire aiguë) nécessitant une **hospitalisation**.
3. **Des cas groupés** (dans le **temps** et dans l'**espace**) **d'Infection Respiratoire Aiguë avec ou sans** notion de **voyage** ou de **contact** avec **un cas confirmé de COVID-19**.

Cas Probable

- Toute personne, **symptomatique ou non**, ayant eu **un contact étroit** avec **un cas confirmé COVID-19** ou un **porteur asymptomatique**.
- Toute personne présentant des **signes cliniques d'infection respiratoire aigüe** avec des **signes scannographiques évocateurs**



Cas confirmé

Toute personne, **symptomatique ou non**, avec une **confirmation d'infection par le SARS-CoV-2 au laboratoire.**

Au cas par cas, sera considéré comme cas suspect tout sujet présentant une **fièvre** et/ou **un signe d'infection respiratoire aiguë** (toux ou difficulté respiratoire) **sans autre étiologie** expliquant la symptomatologie.

Décès COVID-19

Tout **décès** :

résultant d'un **tableau clinique compatible avec **un cas COVID-19 confirmé, non déclaré guéri, sans autre cause directe** du décès

OU

****tout décès d'un cas suspect ou probable avec confirmation par un test post mortem.**

Les zones à risque

sont définies comme :

- Les pays où une **transmission communautaire** du COVID-19 est décrite.

- Les régions de la Tunisie, déclarées par les autorités sanitaires nationales, comme foyers de transmission locale ou communautaire (voir la carte de distribution géographique de l'incidence cumulée).

Définition du contact étroit

Un contact étroit est une personne qui :

- a fourni des soins directs sans équipement de protection individuelle à un cas confirmé
- a partagé le même environnement (lieu de travail, salle de classe, le ménage, rassemblements, salle d'attente, moyens de transports, etc...) qu'un cas confirmé pendant une période \geq 15 minutes avec une distance inférieure à 1 mètre.

La période d'exposition pour un contact étroit d'un cas confirmé

- pour les cas symptomatiques : 3 jours avant la date de début des symptômes et pendant toute la période de portage du virus du cas confirmé
- les cas asymptomatiques : 3 jours avant la date de prélèvement et pendant toute la période de portage du virus du cas confirmé

Le contact tracing

C'est une recherche active des contacts étroits (symptomatiques ou non) des cas confirmés à mettre en œuvre immédiatement après la confirmation par RTPCR.

Les indications du prélèvement

Les indications du prélèvement pour RTPCR : les prélèvements pour analyse virologique doivent être réalisés pour tous cas suspect ou probable, dans le cadre du contact tracing et dans les zones à transmission communautaire soutenue. De même pour toute mort suspecte.